


誤飲を防ぐため、施錠された
場所に保管する等保管管理の徹底




確認しよう！農薬ラベルによる
使用基準の徹底確認



使用前に必ずラベルで
作物名・使用方法・防護装備の
確認をしましょう！


| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| ○ | × | × | 剤 |
| 登録番号 | 登録名称 | 登録作物 | 登録農薬 |
| 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |



土壌くん蒸剤を使用した
後の適切な管理の徹底

看板の設置等
周囲に配慮

土壌くん蒸剤
立ち入り禁止



住宅地等で農薬を使用する
際の周辺への配慮及び
飛散防止対策の徹底

近隣住民への
事前告知



農薬散布は
無風または
風が弱い時に
しましょう！

農薬使用前、 周囲をよく見て見て ラベルをよく見て見て



正しく扱うことが
一番お得です！


https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/

農薬の適正使用 農林水産省

検索



農薬ラベルに記載されている
安全使用上の注意または
被害防止方法を確認しましょう



| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | Aを含む農薬の総使用回数 | 被害防止方法 |
|-----|---|-------------|--------------|----------|---------|------|--------------|-----------------|
| 稲 | コブノメイガ | 1000倍 | 60~150 L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 使用者:長スボン・長袖の作業衣 |
| | ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 イナドロン オウムシ | 1000倍~2000倍 | | | | | | |
| | カメムシ類 | 2000倍 | | | | | | |



その装備、準備バツチリ？
農薬散布時は、薬剤の直接付着や吸い込みを防ぐため、
適切な防護装備を着用することが最重要です。

- ✓ 保護メガネ
- ✓ 農薬用マスク
- ✓ 不浸透性防除衣
- ✓ 不浸透性手袋
- ✓ 長靴

使用後は直ちに着替え、衣服を洗濯し、手洗い・うがい・入浴を徹底してください。

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/

農薬の適正使用 農林水産省

検索



令和8年度農薬危害防止運動

農林水産省・厚生労働省・環境省・都道府県共催